

VOWST®——唯一获得 FDA 批准的口服胶囊微生物组治疗方法，有助于防止 *C. diff* 再次复发

VOWST®  
(fecal microbiota spores,  
live-brpk) capsules

每 4 人中就有 1 人可能再次感染 *C. diff*。

在使用抗生素后，  
通过 VOWST 的

1-2  
内脏拳

杜绝 *C. DIFF* 再次复发的  
几率。



在抗生素治疗后使用 VOWST 比单独使用抗生素更能预防 *C. diff* 复发。

## 适应症

### 什么是 VOWST？

VOWST 是一种处方药，用于预防 18 岁及以上人群在完成 *Clostridioides difficile* (*C. diff*, 艰难梭菌) 感染的抗生素治疗后再次感染 *C. diff*。

VOWST 不用于治疗 *C. diff* 感染。

## 重要安全信息

**请勿在服用抗生素的同时服用 VOWST。** VOWST 含有活细菌，抗生素会干扰 VOWST。

**整粒吞服。切勿压碎、咀嚼或掰开胶囊。** 有关如何服用 VOWST 的完整信息，请参见患者信息。

**请参见重要安全信息全文以及 [随附] 患者信息和完整的处方信息。**

# C. DIFF 复发的风险

即使在接受抗生素治疗后，*C. diff* 仍有可能会重来，这就是所谓的复发。

任何人都可能感染 *C. diff*，但某些因素会增加复发的风险：

- ↑ 服用抗生素
- ↑ 65 岁或以上
- ↑ 住在医院或疗养院
- ↑ 有低弱的免疫体系
- ↑ 使用质子泵抑制剂 (PPI) 治疗胃酸倒流
- ↑ 接触过 *C. diff* 真菌

抗生素可以杀死 *C. diff* 细菌，但也是导致复发的一个主要风险因素。



每 4 人中就有 1 人 (25%)  
复发 *C. diff*



对于这四分之一的人来说，一旦复发，其复发风险会增加到

**65%**

当 *C. diff* 复发时，您可能会出现一些常见症状。如果您有以下症状，请咨询医生\*：



经常出现气味难闻的腹泻



胃痉挛疼痛



发烧




恶心和食欲不振

\*这些是最常见的复发性 *C. diff*，但不是所有可能出现的症状。

# 单独使用抗生素并不能解决导致 *C. DIFF* 复发的失衡问题。

## 抗生素对 *C. diff* 的作用




复发性 *C. diff* 历来只用抗生素治疗。抗生素很重要，因为它们能杀死导致感染的 *C. diff*，但却不能恢复肠道中好坏细菌的平衡，这可能会导致 *C. diff* 复发。



您的肠道中充满了数以万亿计的细菌，它们构成了肠道微生物群。

## 好坏细菌的平衡为何重要



在健康的肠道微生物群中，好坏细菌是平衡的。



但如果您的肠道受到破坏，您身体对 *C. diff* 的天然防御能力就会减弱。



这导致一些人反复感染 *C. diff*。




服用一种能为肠道增加有益菌的微生物组疗法，可能有助于防止 *C. diff* 复发。

# 在使用抗生素后使用 VOWST® 有助于防止 C. DIFF

在一项为期 6 个月的临床研究中，大多数人在使用抗生素后再采取 VOWST 的 1-2 内脏拳，不再复发 C. diff。

完成治疗后不再复发的人数百分比



## 重要安全信息 (续)

在服用 VOWST 之前，请告知医生您的所有病症，包括是否患有肾病，因为您可能无法服用柠檬酸镁泻药；或现在或以前是否患有任何其他病症；是否怀孕或计划怀孕；或是否正在哺乳。

请告诉医生您服用的所有药物，包括处方药和非处方药、维生素和补品药。

## 最常见的副作用 VOWST

VOWST 的耐受性普遍良好——最常见的副作用为轻度至中度。

在一项临床研究中，在服用抗生素后服用 VOWST 和单独服用抗生素的人都会出现这些副作用：

	服用 VOWST 的人 (%)	单独服用抗生素的人 (%)
腹部膨胀	31%	29%
疲劳	22%	22%
便秘	14%	11%
发冷	11%	8%
腹泻	10%	4%


这些并非 VOWST 可能产生的所有副作用——请务必向您的医生报告任何令您困扰或无法消除的副作用。



您可以致电 1-833-246-2566 向 Aimmune Therapeutics 公司报告副作用，或致电 1-800-FDA-1088 或 [www.fda.gov/MedWatch](http://www.fda.gov/MedWatch) 向 FDA 报告。

请参见重要安全信息全文以及 **【随附】患者信息** 和完整的 **处方信息**。

**VOWST**  
(fecal microbiota spores,  
live-brpk) capsules



## VOWST® 是如何发挥作用的？

VOWST 被认为可以通过以下方式预防复发性 C. diff\* 的发生。

### 首先抗生素



杀灭导致感染的 C. diff 细菌

### 其后 VOWST



以不同于抗生素的方式为您的肠道恢复有益菌群。

好细菌



这被认为有助于恢复肠道微生物群中好细菌和坏细菌的平衡，

坏细菌



这有助于防止 C. diff 复发重来。

VOWST 并非益生菌。

\*VOWST 的作用机理尚未确定。

### 重要安全信息 (续)

VOWST 最常见的副作用是：

- 腹胀
- 疲劳
- 便秘
- 发冷
- 腹泻

这些并非 VOWST 可能产生的所有副作用。有关副作用的医疗建议，请致电您的医生。我们鼓励您向 FDA 报告不良副作用。请致电 1-800-FDA-1088 或访问 [www.fda.gov/MedWatch](http://www.fda.gov/MedWatch)。

请参见重要安全信息全文以及【随附】患者信息和完整的处方信息。

**VOWST®**  
(fecal microbiota spores,  
live-brpk) capsules

# 如何服用 VOWST®？

在服用抗生素后，在家口服 VOWST，分两步服用。



## VOWST 含有\* 相同的有益菌。

天然存在于人们健康的肠道微生物群中。

抗生素

## 第1步 完成一个完整的抗生素疗程。

在服用完抗生素后的1到3天内，喝一剂10 盎司的泻药（柠檬酸镁）。

如果您患有肾病，请告诉医生，因为您可能无法服用柠檬酸镁泻药。

- 这比结肠镜检查所用的泻药量要少得多，结肠镜检查所用的泻药量可达128 盎司。
- 服用泻药很重要，因为它可以清除肠道中残留的抗生素，使 VOWST 能够正常工作。

第一天  
0000

## 第2步 口服 4 粒 VOWST，每天一次， 连续服用 3 天。

3 天

在首次服用 VOWST 前至少 8 小时不要进食或饮水。

- 例如，您可以在首次服用 VOWST 前至少 8 小时的晚上服用泻药，并禁食一夜。

在您第一餐前空腹服用 VOWST。

整粒吞服。切勿压碎、咀嚼或掰开胶囊。

不要在服用抗生素或泻药的同时服用 VOWST。

访问 [vowst.com/how-do-i-take-vowst](http://vowst.com/how-do-i-take-vowst)，了解更多有关如何服用 VOWST 的信息。



### FDA 批准

VOWST 是一种经 FDA 批准的口服胶囊微生物组治疗方法，由从合格捐赠者粪便中分离出来的有益菌组成。



### 经过严格的质量控制流程

在 VOWST 的生产和纯化过程中，会对合格的捐赠者进行仔细筛选，并对样本进行例行检测。



VOWST 可在家中口服，  
是唯一获得 FDA 批准的  
口服微生物组疗法

胶囊非实际大小

\*非活性成分：甘油、生理盐水。

### 重要安全信息

请勿在服用抗生素的同时服用 VOWST。VOWST 含有活细菌，抗生素会干扰 VOWST。

整粒吞服。切勿压碎、咀嚼或掰开胶囊。有关如何服用 VOWST 的完整信息，请参见患者信息。

请参见重要安全信息全文以及【随附】患者信息和完整的处方信息。

**VOWST**  
(fecal microbiota spores,  
live-brpk) capsules

# VOWST VOYAGE™ 支持计划 在您的治疗之旅中助您一臂之力\*。



## 病案经理电话

VOWST® 仅通过专科药房发药。在您的医生帮助您加入 VOWST Voyage 支持计划后，病案经理将核实您的保险计划是否承保 VOWST，并告诉您哪家专科药房将为您配送 VOWST 处方。



## 发货安排

接下来，您将收到 VOWST 处方的发货安排电话——接听电话以接受 VOWST 发货非常重要。



## 欢迎套件发货

最后，病案经理将与您联系，回答您对该计划的任何疑问，并协调将欢迎套件（可能包含泻药）直接运送到您家中。



## 用药短信提醒

收到 VOWST 后，您每次该服用 VOWST 时都会收到有用的短信提醒（只有在您选择接收短信时才会收到短信）。

\*您无需加入 VOWST Voyage 支持计划即可获得 VOWST 处方。

**VOWST**  
**Voyage™**

**VOWST VOYAGE 支持计划还为符合条件的患者提供经济援助。**

## VOWST 共付额节省计划

VOWST 共付额节省计划可用于将您的 VOWST 自付费降至最低 0 美元，每个日历年最多可节省 9,100 美元。该优惠不适用于处方由联邦医疗保险、医疗补助计划或其他州或联邦医疗保健计划报销的患者，或法律禁止的情况。

如需阅读完整的条款、条件和资格要求，请访问 [VOWSTcopay.com](http://VOWSTcopay.com)。

## VOWST 患者援助计划

如果您符合财务和其他资格要求，无保险或保险不足的患者可能有资格免费接受 VOWST 治疗。

如果您担心无法负担  
VOWST 处方药的费用，  
请致电 888-356-5444  
联系我们，我们或许可以  
提供帮助。



请参见重要安全信息全文以及【随附】患者信息和完整的处方信息。

# 重要安全信息

## 重要安全信息

**请勿在服用抗生素的同时服用 VOWST。VOWST 含有活细菌，抗生素会干扰 VOWST。**

**整粒吞服。切勿压碎、咀嚼或掰开胶囊。有关如何服用 VOWST 的完整信息，请参见患者信息。**

**VOWST 最常见的副作用有：**

- 腹胀
- 发冷
- 疲劳
- 腹泻
- 便秘

这些并非 VOWST 可能产生的所有副作用。有关副作用的医疗建议，请致电您的医生。我们鼓励您向 FDA 报告不良副作用。请致电 1-800-FDA-1088 或访问 [www.fda.gov/MedWatch](http://www.fda.gov/MedWatch)。

**在服用 VOWST 之前，请告知医生您的所有病症，包括您是否患有肾病，因为您可能无法服用柠檬酸镁泻药；或现在或曾经患有任何其他病症，正在怀孕或计划怀孕，或正在哺乳。**

**告诉医生您服用的所有药物，包括处方药和非处方药、维生素和补品药。**

## 适应症

**什么是 VOWST？**

VOWST 是一种处方药，用于预防 18 岁及以上人群在完成 *Clostridioides difficile* (*C. diff*)，艰难梭菌感染的抗生素治疗后再次感染 (*C. diff*)。

**VOWST 不用于治疗 *C. diff* 感染。**

请参见重要安全信息全文以及**【随附】患者信息**和完整的**处方信息**。

**VOWST<sup>®</sup>**  
(fecal microbiota spores,  
live-brpk) capsules

一旦出现 C. DIFF 复发  
的迹象, 请与您的医  
生讨论 VOWST®。



访问 VOWST.com 或扫描此二维码以访问特殊专  
题, 包括“如何服用 VOWST”视频、“测试您的复  
发性 C. Diff 知识”测验、常见问题答案等!

## 重要安全信息

请勿在服用抗生素的同时服用 VOWST。VOWST 含有活细菌, 抗生素会干扰 VOWST。

整粒吞服。切勿压碎、咀嚼或掰开胶囊。有关如何服用 VOWST 的完整信息, 请参见患者信息。

请参见重要安全信息全文以及 **[随附] 患者信息** 和完整的处方信息。

**VOWST®**  
(fecal microbiota spores,  
live-brpk) capsules

所有商标均为瑞士沃韦 Société des Produits Nestlé S.A. 所有, 或且使用经过许可。  
© 2025 Nestlé.

VOW-PM-USA-0518 08/25

**Nestlé**  
HealthScience®