

VOWST®, el único tratamiento microbiómico aprobado por la FDA, en cápsulas orales, que ayuda a prevenir la recurrencia de *C. diff*

VOWST®
(esporas de microbiota fecal, brpk vivas), en cápsulas

La infección por *C. diff* puede afectar de nuevo a 1 de cada 4 personas

**TERMINE CON LA POSIBILIDAD DE
OTRA RECURRENCIA DE *C. DIFF*
CON EL PONCHE INTESTINAL**

**1-2
DE VOWST**

**DESPUÉS DE UN
ANTIBIÓTICO**



VOWST utilizado después del tratamiento con antibióticos puede prevenir la recurrencia de *C. diff* mejor que un tratamiento antibiótico solo

INDICACIÓN

¿Qué es VOWST?

VOWST es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para prevenir la recurrencia de la infección por *Clostridioides difficile* (*C. diff*) en personas de 18 años o más después de terminar el tratamiento con antibióticos debido a una infección por *C. diff*.

VOWST no está indicado para el tratamiento de la infección por *C. diff*.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No tome VOWST al mismo tiempo que los antibióticos. VOWST contiene bacterias vivas y los antibióticos pueden interferir con VOWST.

Cada una de las cápsulas se debe tragar entera. NO triture, mastique ni rompa la cápsula. Consulte toda la información sobre cómo tomar VOWST en la Información para el paciente.

Consulte la Información importante de seguridad en este documento y en la Información para el paciente y la Información de prescripción completa [que se adjuntan].


EL RIESGO DE RECURRENCIA DE C. DIFF

C. diff puede reaparecer incluso después del tratamiento con un antibiótico. Esto se llama **recurrencia**.

C. diff puede infectar a cualquier persona, pero hay determinados factores que pueden aumentar el riesgo de recurrencia:

- 👉 Tomar antibióticos
- 👉 Tener 65 años de edad o más
- 👉 Estar en un hospital o residencia de ancianos
- 👉 Tener un sistema inmunitario debilitado
- 👉 Usar un tratamiento con inhibidor de la bomba de protones (IBP) para el reflujo ácido
- 👉 Estar expuesto a C. diff

Aunque los antibióticos pueden matar a C. diff, hay un factor de riesgo principal de recurrencia



C. diff reaparece en aprox.
1 DE CADA 4 PERSONAS (25%)



Para aquellas 1 de cada 4 personas, una vez que hay una recaída, el riesgo de nuevas recurrencias aumenta hasta un
65%

Cuando C. diff reaparece, puede reconocer algunos síntomas comunes. Informe a su médico si presenta*:



Diarrea frecuente
que huele especialmente mal



Cólicos dolorosos



Fiebre




Náuseas y pérdida del apetito

*Estos son los síntomas más frecuentes de C. diff, aunque no son todos los posibles síntomas.

CUANDO SE UTILIZAN SOLOS, LOS ANTIBIÓTICOS NO ABORDAN EL DESEQUILIBRIO QUE PUEDE PROVOCAR LA RECURRENCIA DE *C. DIFF*

El papel de los antibióticos en *C. diff*




Las recurrencias de *C. diff* se han tratado con antibióticos solamente. Los antibióticos son importantes porque matan las bacterias de *C. diff* que causan la infección, pero no restauran el equilibrio entre bacterias buenas y malas en el intestino, lo que puede provocar la recurrencia de *C. diff*.



El intestino tiene trillones de bacterias que forman el microbioma intestinal

Por qué es importante el equilibrio entre bacterias buenas y malas



En un microbioma intestinal sano, hay un equilibrio entre las bacterias buenas y las malas



Pero si se altera el intestino, se debilita la defensa natural del cuerpo contra *C. diff*



Esto provoca que algunas personas desarrollen una y otra vez infecciones por *C. diff*



Tomar un tratamiento microbiómico que aumenta la cantidad de bacterias buenas en el intestino puede ayudar a evitar la recurrencia de *C. diff*

VOWST® UTILIZADO DESPUÉS DE UN ANTIBIÓTICO PUEDE AYUDAR A PREVENIR OTRA RECURRENCIA DE C. DIFF

En un estudio clínico que duró 6 meses, la mayoría de las personas que recibieron el PONCHE INTESTINAL 1-2 de VOWST después de un antibiótico no tuvo una recurrencia de *C. diff*

Porcentaje de personas sin recurrencias después de terminar el tratamiento



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

Antes de tomar VOWST, informe a su médico sobre todas sus afecciones médicas, incluido si usted: tiene una afección renal porque es posible que no pueda tomar el laxante de citrato de magnesio, o tiene cualquier otra afección médica en la actualidad o la ha tenido en el pasado, está embarazada o planea quedar embarazada, o está amamantando.

Informe a su médico sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta médica y de venta libre, vitaminas y suplementos.

EFFECTOS SECUNDARIOS MÁS FRECUENTES DE VOWST

VOWST fue, en general, bien tolerado. Los efectos secundarios más frecuentes fueron leves o moderados

En un estudio clínico, estos efectos secundarios se observaron en personas que tomaron VOWST después del tratamiento antibiótico y en las personas que tomaban solo antibióticos:

	Personas que tomaban VOWST	Personas que tomaban SOLO ANTIBIÓTICOS
distension abdominal	31%	29%
fatiga	22%	22%
estrenimiento	14%	11%
escalofríos	11%	8%
diarrea	10%	4%

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de VOWST. Asegúrese de informar a su médico sobre cualquier efecto secundario que le moleste o no desaparezca.



Puede notificar los efectos secundarios a Aimimmune Therapeutics, Inc. llamando al 1-833-246-2566 o a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088 o en www.fda.gov/MedWatch.

Consulte la Información importante de seguridad en este documento y en la [Información para el paciente](#) y la [Información de prescripción completa](#) [que se adjuntan].

VOWST
(esporas de microbiota fecal,
bacterias vivas), en cápsulas



ANTI-BIOTICS

¿CÓMO FUNCIONA VOWST®?

Se cree que VOWST funciona de la siguiente manera para prevenir la recurrencia de *C. diff**:

PRIMEROS ANTIBIÓTICOS




Mata la bacteria *C. diff* que le causa la infección

ENTONCES VOWST



Funciona de manera diferente a los antibióticos añadiendo bacterias buenas en el intestino



Se ha diseñado para ayudar a restaurar el equilibrio entre bacterias buenas y malas en el microbioma intestinal



Lo que ayuda a prevenir la recurrencia de *C. diff*

VOWST no es un probiótico.

*No se ha establecido el mecanismo de acción de VOWST.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

Los efectos secundarios más frecuentes de VOWST incluyen:

- distensión abdominal
- escalofríos
- fatiga
- diarrea
- estreñimiento

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de VOWST. Llame a su médico para recibir asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Se le recomienda que informe a la FDA los efectos secundarios negativos. Llame al 1-800-FDA-1088 o visite www.fda.gov/MedWatch

Consulte la Información importante de seguridad en este documento y en la [Información para el paciente](#) y la [Información de prescripción completa](#) [que se adjuntan].

VOWST®
(esporas de microbiota fecal, brpk vivas), en cápsulas

¿CÓMO TOMO VOWST®?

VOWST se toma por vía oral en casa después del tratamiento antibiótico en un programa de dosis de 2 pasos



VOWST CONTIENE* LAS MISMAS BACTERIAS BUENAS

que se encuentran de manera natural en los microbiomas intestinales de las personas sanas

ANTI-BIOTICS

PASO 1 Termine un ciclo completo de antibióticos.

Al día siguiente o en los 3 días siguientes de terminar el tratamiento antibiótico, beba una dosis de 10 oz. de laxante (citrato de magnesio)

Informe a su médico si tiene una enfermedad renal porque es posible que no pueda tomar el laxante de citrato de magnesio.

- Este es un volumen de laxante mucho menor que el utilizado para una colonoscopia, que puede ser de 128 oz
- Tomar un laxante es importante porque puede eliminar del intestino el resto de los antibióticos, para que VOWST pueda funcionar correctamente



3 DÍAS

PASO 2 Tome 4 cápsulas de VOWST por vía oral una vez al día durante 3 días.

No coma ni beba durante al menos 8 horas antes de recibir la primera dosis de VOWST.

- Por ejemplo, puede tomar el laxante en la noche al menos 8 horas antes de la primera dosis de VOWST y ayunar toda la noche

Tome VOWST antes de la primera comida con el estómago vacío.

Trague cada una de las cápsulas enteras. NO triture, mastique ni rompa las cápsulas.

No tome VOWST al mismo tiempo que los antibióticos o el laxante.

Visite vowst.com/how-do-i-take-vowst para obtener más información sobre cómo tomar VOWST



APROBADO POR LA FDA

VOWST es un tratamiento microbiómico aprobado por la FDA, en cápsulas orales, compuesto de bacterias buenas aisladas de las heces de donantes que reúnen los requisitos.



SOMETIDO A UN ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD

Se hacen pruebas exhaustivas a los donantes que reúnen los requisitos y las muestras se analizan rutinariamente durante los procesos de producción y purificación de VOWST.



VOWST se toma por vía oral en casa y es el único tratamiento microbiómico aprobado por la FDA.

Las cápsulas no están representadas a tamaño real.

*Componentes inactivos: glicerol, solución salina.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No tome VOWST al mismo tiempo que los antibióticos. VOWST contiene bacterias vivas y los antibióticos pueden interferir con VOWST.

Cada una de las cápsulas se debe tragar entera. NO triture, mastique ni rompa la cápsula. Consulte toda la información sobre cómo tomar VOWST en la Información para el paciente.

Consulte la Información importante de seguridad en este documento y en la [Información para el paciente](#) y la [Información de prescripción completa](#) [que se adjuntan].

VOWST
(esporas de microbiota fecal, brpk vivas), en cápsulas

EL PROGRAMA DE APOYO VOWST VOYAGE™ LE AYUDA EN SU PROCESO DE TRATAMIENTO*



LLAMADA AL ADMINISTRADOR DE CASOS

VOWST® está solamente disponible mediante entrega en farmacias especializadas. Una vez que su médico ayuda a inscribirlo en el programa de apoyo VOWST Voyage, un administrador de casos verificará la cobertura de VOWST por su plan de seguro y le informará qué farmacia especializada le enviará su prescripción de VOWST.



PROGRAMACIÓN DE LA ENTREGA

A continuación, recibirá una llamada para programar su prescripción de VOWST. Es muy importante que responda a la llamada para aceptar su envío de VOWST.



ENVÍO DEL KIT DE BIENVENIDA

Finalmente, el administrador de casos se pondrá en contacto con usted para responder cualquier pregunta que pueda tener sobre el programa y coordinar el envío de un kit de bienvenida, que puede contener su laxante, directamente a su casa.



MENSAJES DE RECORDATORIO DE DOSIS

Una vez que reciba su envío de VOWST, recibirá recordatorios útiles por mensajería de texto cada vez que deba tomar una dosis de VOWST (solamente recibirá mensajes de texto si acepta recibirlos).

*No tiene la obligación de inscribirse en el programa de apoyo VOWST Voyage para que le prescriban VOWST.

EL PROGRAMA DE APOYO VOWST VOYAGE TAMBIÉN OFRECE AYUDA FINANCIERA A LOS PACIENTES ELEGIBLES

Programa de ahorros con los copagos de VOWST

El programa de ahorro con los copagos de VOWST se puede utilizar para recibir sus gastos de bolsillo para que VOWST le pueda salir gratis, con un monto máximo de ahorros de \$9,100 por año natural. La oferta no es válida para los pacientes cuyas prescripciones sean reembolsadas por Medicare, Medicaid u otro programa estatal o federal de atención médica, o donde lo prohíba la ley.

Para leer todos los términos, condiciones y requisitos de elegibilidad, visite VOWSTcopay.com.



Programa de ayuda a pacientes que reciben VOWST

Los pacientes sin seguro médico o sub-asegurados podrían reunir los requisitos para recibir VOWST sin costo alguno si cumplen los requisitos financieros y otros requisitos de elegibilidad.

Si le preocupa poder costear su prescripción de VOWST, llámenos al 888-356-5444 y podríamos ayudarlo



VOWST
Voyage™

Consulte la Información importante de seguridad en este documento y en la [Información para el paciente](#) y la [Información de prescripción completa](#) [que se adjuntan].

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No tome VOWST al mismo tiempo que antibióticos. VOWST contiene bacterias vivas y los antibióticos pueden interferir con VOWST.

Cada una de las cápsulas se debe tragar entera. NO triture, mastique ni rompa la cápsula. Consulte toda la Información para el paciente sobre cómo tomar VOWST en la Información para el paciente.

Los efectos secundarios más frecuentes de VOWST incluyen:

- distensión abdominal
- escalofríos
- fatiga
- diarrea
- estreñimiento

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de VOWST. Llame a su médico para recibir asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Se le recomienda que informe a la FDA los efectos secundarios negativos. Llame al 1-800-FDA-1088 o visite www.fda.gov/MedWatch.

Antes de tomar VOWST, informe a su médico sobre todas sus afecciones médicas, incluido si usted: tiene una infección renal porque es posible que no pueda tomar el laxante citrato de magnesio, o tiene cualquier otra afección médica en la actualidad o la ha tenido en el pasado, está embarazada o planea quedar embarazada, o está amamantando.

Informe a su médico médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta médica y de venta libre, vitaminas y suplementos.

INDICACIÓN


¿Qué es VOWST?

VOWST es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para prevenir la recurrencia de la infección por *Clostridioides difficile* (*C. diff*) en personas de 18 años o más después de terminar el tratamiento con antibióticos debido a una infección por *C. diff*.

VOWST no está indicado para el tratamiento de la infección por *C. diff*.

Consulte la Información importante de seguridad en este documento y en la Información para el paciente y la Información de prescripción completa [que se adjuntan].

AL PRIMER SIGNO DE RECURRENCIA DE *C. DIFF*, HABLE CON SU MÉDICO SOBRE VOWST®



iVisite VOWST.com o escanee este código QR para acceder a funciones especiales, incluidos el video sobre cómo tomar VOWST, el cuestionario sobre sus conocimientos sobre la recurrencia de *C. Diff*, respuestas a preguntas frecuentes y más!

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No tome VOWST al mismo tiempo que los antibióticos. VOWST contiene bacterias vivas y los antibióticos pueden interferir con VOWST.

Cada una de las cápsulas se debe tragar entera. NO triture, mastique ni rompa la cápsula. Consulte toda la información sobre cómo tomar VOWST en la Información para el paciente.

Consulte la Información importante de seguridad en este documento y en la Información para el paciente y la Información de prescripción completa [que se adjuntan].

VOWST®
(esporas de microbiota fecal,
bacterias vivas), en cápsulas

Todas las marcas registradas son propiedad de Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Suiza o de uso autorizado.

© 2025 Nestlé.

VOW-PM-USA-0517 09/25

Nestlé
HealthScience®